



# 心臓血管外科にて 下肢静脈瘤のレーザー治療

## を行っています

下肢静脈瘤は、足にどんな症状がでるの？

血管が  
ボコボコ  
している

だるい  
重い  
疲れやすい

むくむ  
ほてる

皮膚の  
黒ずみ  
がある

かゆみ  
湿疹

こむら返り  
(足がつる)  
を起こす

### 下肢静脈瘤とは？

足の静脈には、心臓に血液を戻す時、逆流しないように弁がついています。その弁が壊れてしまうと、血液の逆流が起こり、静脈に血液が溜まって膨れ・蛇行・コブができます。

下肢静脈瘤が、発生しやすい人は？

- 女性と男性では、女性のが約3倍多く、加齢と共に増加します。
- 長時間の立ち仕事に従事されている方。
- 親族に静脈瘤の方がいる。(遺伝性があります。)
- 女性の場合、妊娠・出産をきっかけに発生することが多い。

レーザー治療と当院での診察は？

静脈の中に細いファイバーを挿入し、レーザーの熱によって静脈を塞ぐ新しい治療方法です。(弁が壊れた静脈を塞いでも他の静脈が心臓に血液を運んでくれるので問題ありません。)従来の治療法より術創が少なく、体に優しく傷跡もほとんど目立ちません。出血も少ない治療法です。

当院では1泊入院でレーザー治療を行っており、**保険適用**となります。治療時間は片足30分~60分程度で、両足の手術も可能です。また麻酔方法にもよりますが術後すぐ歩行が可能です。当院では **水・金・土** の午前(受付8:30-12:00)に診察をしています。お気軽にご相談ください。

心臓医血管外科は

**水 金 土**

の午前です

